

Ueber einen Fall
von
Adeno-Fibrom
der weiblichen Brustdrüse.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
unter dem Präsidium

des
Herrn Professor Dr. O. Bollinger
o. ö. Professor und Vorstand des pathologischen Instituts zu München.

Der
hohen medicinischen Facultät zu München
vorgelegt

von
Franz Xaver Fischl,
pract. Arzt aus Ellingen.

München, 1882.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München.

Ueber einen Fall
von
Adeno-Fibrom
der weiblichen Brustdrüse.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
unter dem Präsidium

des

Herrn Professor Dr. O. Bollinger

o. ö. Professor und Vorstand des pathologischen Instituts zu München.

Der

hohen medicinischen Facultät zu München

vorgelegt

von

Franz Xaver Fischl,

pract. Arzt aus Ellingen.

München, 1882.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

Meinem lieben Vater

gewidmet.

„Die Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Brustdrüfengeschwülste hat schon seit langer Zeit das besondere Interesse der Anatomen und Chirurgen in Anspruch genommen. War es früher die sonderbare Mannichfaltigkeit der Tumoren an sich, was den Forscher reizte, so ist es jetzt die Entwicklungsgeschichte dieser Formen, die ihn immer auf's Neue wieder anzieht. Der Arzt aber, der auf wissenschaftlicher und humanitärer Basis zugleich steht, sucht nach einer morphologischen Handhabe für die Frage, ob die vorliegende Geschwulst der Klasse jener schrecklichen Carcinome angehört, die dem Leben so vieler Frauen, oft noch in ihrer vollen Kraft, ein Ende setzen; da er es vorläufig aufgeben muß, Mittel und Wege zu finden, die Entstehung dieser entsetzlichen Neubildungen zu verhindern, da auch jede diätetische und medicamentöse Behandlung bisher fehlschlug, kann er nur in der möglichst frühzeitigen Erkenntniß und Entfernung des ersten Krankheitsherd, von welchem aus sich das Uebel auf den Körper verbreitet, die Momente finden, durch welche er zu helfen vermag. An dem frühzeitigen Erkennen des gefährlichen Feindes muß ihm also im Interesse seiner Patienten besonders viel gelegen sein.“

Diese Worte, mit denen Billroth seine neueste Arbeit über Brustdrüfengeschwülste einleitet, haben mich ermuntert, mich mit dem vorliegenden Falle näher zu beschäftigen, in der Absicht, zur Förderung der frühzeitigen Erkenntniß dieser dem

practifchen Arzte fo häufig entgegentretenden Behandlungs-objecte etwas beizutragen.

Es ift eine Eigenthümlichkeit der Mammageschwülfte, dafs fie alle, auch die gutartigen, gleich von Anfang an Drüfenläppchen einfchließen, welche faft nie zu Grunde gehen, fondern fich in mannichfacher Weife verändern; ferner dafs fie meift nicht nur durch ihr Wachsthum fich vergrößern, fondern auch dadurch, dafs fie nach und nach mehr oder weniger benachbarte Drüfenläppchen mit in den Procefs hereinziehen. Diefes Umfichgreifen der Gefchwulft macht bei den Fibromen und Sarcomen in der Regel auf einem gewissen Punkte Halt, indem fich die Neubildung von dem gefunden Gewebe ifolirt. Dies kommt dadurch zu Stande, dafs durch den Reiz, den die fich vergrößernde Gefchwulft auf ihre Nachbarschaft ausübt, das umliegende Bindegewebe zur Vermehrung und Verdichtung feiner Elemente angeregt wird, wodurch fich eine Art bindegewebiger Kapsel um die Gefchwulft bildet. Bei den Carcinomen, auch bei manchen Adenomen und Cyftenbildungen ift dies aber in der Regel nicht der Fall, es erkrankt vielmehr nach und nach die ganze Drüfe oder doch der größte Theil derfelben. Die Carcinome zeichnen fich noch dadurch in fehr unvortheilhafter Weife aus, dafs fie auch die der Drüfe angrenzenden Gebilde mit ergreifen und Metastafen, befonders in den Lymphdrüfen, fetzen.

Was die Häufigkeit des Vorkommens der verschiedenen Bruftdrüfengeschwülfte anbelangt, fo fteht hier hoch oben an das Carcinom. Unter 440 von Billroth notirten Bruftdrüfengeschwülften befanden fich 375, das ift 82% carcinomatöfe, 65, das ift 18% nicht carcinomatöfe Tumoren.

Von den nicht carcinomatöfen Tumoren kommt am häufigften das Sarcom zur Beobachtung, während Angiome und Neurome nach Billroth nie in der Bruftdrüfe felbft zur Entwicklung gekommen find. Das Lipom, Chondrom und Osteom ift in der Bruftdrüfe äufferft felten.

Cystengegeschwülste finden sich nicht eben selten, bleiben aber in der Regel klein; ebenso kommt das Fibrom öfters vor.

Was das Adenom anbelangt, so wird eine eigentliche Neubildung von Drüsenelementen von manchen Autoren völlig in Abrede gestellt, allein durch die Forschungen von Förster, Rokitansky, Wagner, Neumann, Kolb u. A. dürfte sie doch als sicher vorkommend zu betrachten sein.

Nach Wagner ist die Genese des neugebildeten Drüsengewebes in den meisten Fällen dieselbe wie die des normalen. Bisweilen findet nur eine Vergrößerung der Drüsenzellen und damit der kleinsten Abtheilungen der Drüse, das ist: der Follikel, Acini u. s. w., statt. Andermal vermehren sich die Drüsenzellen durch wiederholte Theilung: dabei wird entweder die kleinste Drüsenabtheilung gleichmäfsig gröfser; oder es entstehen knospenartige, anfangs solide Auswüchse oder Zapfen, welche in das umliegende Bindegewebe hinein wachsen, wieder neue Auswüchse bilden und sich häufig gleichzeitig verästeln. Diese Zapfen höhlen sich später bisweilen aus und erhalten so ein drüsenähnliches Lumen, öfter aber bleiben sie immer solid. In ihrer Peripherie sind sie manchmal mit einer Tunica propria begleitet. Bindegewebs- und Gefäfsentwicklung geht ebenfalls vor sich. Nach der Hypothese von Cohnheim kommt hier die Bindegewebsneubildung dadurch zu Stande, dafs das Bindegewebe auf die Wucherung des Epithels mit der Reaction antwortet, dafs es ebenfalls wuchert.

Diese Geschwülste bleiben weiterhin in Verbindung mit dem alten Drüsenabschnitt, oder isoliren sich vollständig davon, oder auch es erkrankt die ganze Drüse.

Die Function des neugebildeten Drüsengewebes ist selten vollkommen gleich der normalen Drüsen; meist hat es keine Function.

Die Adenome sind an sich gutartige Neubildungen, welche nach gründlicher Exstirpation meist nicht recidiviren. Viele aber haben eine Neigung, in krebsartige Formen überzugehen.

Die in Rede stehende Geschwulstart ist weniger scharf begrenzt als die meisten andern Neubildungen, besonders zeigen sich nicht selten Uebergangsformen zum Drüsenkrebs (Adeno-Carcinom).

Eine Geschwulst, die nicht mehr neugebildetes gefäßhaltiges Bindegewebe enthält, als zum Stroma der Neubildung gehört, werden wir kurzweg als Adenom bezeichnen. In der Regel wird sich aber eine mehr oder minder grössere Menge von neugebildetem Bindegewebe oder auch von sarcomatösem Gewebe oder auch es werden sich Cysten vorfinden, kurz wir werden in den meisten Fällen eine Combination von verschiedenartigem neugebildeten Gewebe vor uns haben, und je nach Befund den vorliegenden Tumor mit dem Namen Adeno-Fibrom, Adeno-Sarcom u. s. f. belegen.

Das Adenom ist eine in der Mamma ziemlich selten gefundene Geschwulstart.

Es dürfte hier der geeignete Ort sein eines in mehrerlei Beziehungen interessanten Falles von Adenom der männlichen Brustdrüse Erwähnung zu thun, welcher vor 2 Jahren von Roemer in seiner Inaugural-Differtation: „Ueber einen Fall von Adenom der männlichen Brustdrüse ¹⁾“ beschrieben wurde.

Der davon Betroffene, Johannes Goetz aus Niederstotzingen, 71 jähriger Holzmacher, rannte vor 15 Jahren in der Dunkelheit mit der rechten Brust an eine Wagendeichsel, wodurch ihm aber damals keine erheblichen Beschwerden verursacht wurden. Am andern Morgen sah er an der Hautstelle keine Veränderung, nur dumpfe Schmerzen dauerten an der betreffenden Stelle 8 Tage lang fort. Nach 4—5 Wochen bemerkte er unter der Haut einen erbsengroßen, unter derselben verschiebbaren Höcker, der im Verlauf von 12 Jahren langsam und schmerzlos zu der jetzigen Grösse heranwuchs. Die Consistenz des

¹⁾ München 1880. Das betreffende Präparat befindet sich in der Sammlung des Patholog. Instituts zu München.

Tumors war, nach der bestimmten Angabe des Patienten, in den obern Theilen hart, nach unten etwas weicher. Die Haut nahm allmählig eine etwas bläuliche Färbung an; Neujahr 1877 bemerkte Patient ein allmähliches Weichwerden der Geschwulst, und als er eines Morgens erwachte, waren Hemd und Bett mit Blut befleckt; in der Gegend der Warze war eine ziemlich geradlinige, Oeffnung entstanden, in die er seinen kleinen Finger einlegen konnte. Patient spülte die Wunde fortwährend mit Kamillenthee aus, wobei immer „geronnenes Blut“ sich mit entleerte.

Mit der Zeit stellten sich heftigere Schmerzen ein, das Wundsecret nahm einen stinkenden Geruch an, die Oeffnung wurde etwas kleiner. Zu gleicher Zeit entwickelte sich ca 3 cm von der Oeffnung entfernt, gegen die Achselhöhle hin, unter der Haut eine neue Geschwulst, die Anfangs von der andern deutlich abgegrenzt war. Die Haut über derselben wurde geröthet, nach einem Zeitraum von 6 Wochen kam es auch hier zur Perforation. Es entleerte sich wenig Blut, aber stinkender Eiter. Patient spritzte mit Carbolwasser aus, allein trotzdem nahm das Secret einen noch übleren Geruch an. Im Oktober 1879 kam Patient in Behandlung des Herrn Dr. Roemer. Das Allgemeinbefinden des Patienten war trotz der länger dauernden Eiterung ein relativ gutes. In der Gegend der rechten Brustwarze fand sich ein Tumor von halbkugelförmiger, resp. ovaler Form, dessen Consistenz mäßig hart war. Die Haut war mit dem Tumor verwachsen, auf dem M. pector. war Verschiebung möglich. In der Gegend der Papille war ein 50 Pfennigstück großes, kraterförmiges Geschwür; ein zweites, etwa 2 Markstück groß, befand sich in der Nähe. Zwischen beiden Geschwüren zeigte sich eine sattelförmige Vertiefung. Von den tieferliegenden Achseldrüsen waren mehrere bis zu ErbsegröÙe angeschwollen.

Dieser Symptomencomplex verleitete zur Annahme von Krebs.

Die Operation wurde vorgenommen, wobei aber ungünstiger Verhältnisse halber einstweilen von der Achseldrüsenexstirpation abgesehen wurde. Nach 16 Tagen war definitive Heilung eingetreten, und, zu nicht geringem Erstaunen der behandelnden Aerzte, waren die angeschwollenen Drüsen in der Achsel nicht mehr zu fühlen. Man mußte sich also fagen, daß die Anschwellung nicht auf krebfiger Infiltration, sondern bloß auf entzündlicher Reizung beruhte. Die microscopische Untersuchung des Tumors, die unter Leitung des Professors Bollinger im Patholog. Institute zu München angestellt wurde, zeigte denn auch, daß die auf Krebs gestellte Diagnose ein Irrthum war und daß man es mit einem Adenom zu thun hatte.

Vor kurzer Zeit (Ende Mai 1882) hat Dr. Roemer Professor Bollinger eine Mittheilung zugehen lassen, worin er zu wissen macht, daß er gelegentlich einer Reise den Goetz wieder zu Gesicht bekam, wobei er fand, daß, über 2 Jahre nach der Operation, sowohl die Operationsstelle als auch die Achseldrüsen vollständig von Recidiv frei war, wodurch die Richtigkeit der auf Adenom gestellten Diagnose erwiesen sein dürfte.

Ich werde nun zur Erörterung der den Gegenstand meiner Untersuchung bildenden Geschwulst übergehen.

Krankengeschichte.¹⁾

Jakobine Koegel, 44jährige Gütlersgattin von Mitbüchel im bayerischen Oberlande spürte schon als 16—20jähriges Mädchen in der rechten Brustdrüse einen kleinen haselnußgroßen Knoten, für dessen Entstehen sie gar keine Ursache verantwortlich machen kann. In ihrem 29. Lebensjahre heirathete sie und wurde nach einem Jahre vom ersten Kinde entbunden, dem sie aber die Brust nicht gab. Nach diesem Wochenbette wurde der Knoten in der Mamma größer und schmerzhaft, und das-

¹⁾ Ich verdanke die Notizen aus der Krankengeschichte der Freundlichkeit des Herrn Generalstabsarztes Professor Dr. v. Nufsbaum, in dessen Privatheilanstalt Patientin operirt wurde.

felbe ereignete sich nach einem jeden der noch folgenden 5 Wochenbetten; das letzte fand vor 2 Jahren statt. Alle 6 Kinder leben und sind gesund; an der Brust hatte sie keines. Nachdem, wie schon erwähnt, jedes Wochenbett das Brustleiden vergrößert und verschlimmert hat, ist seit einem Jahre der ununterbrochene Schmerz so arg, daß er der Patientin den Schlaf raubte, weshalb sie sich gerne zur Operation entschloß, welche am 5. Oktober d. J. durch Herrn Professor Dr. von Nussbaum in dessen Privatheilanstalt vorgenommen wurde. Der Tumor zog sehr schwer an der Brust und bildete durch den bedeutenden Zug eine Art Stiel, während sonst die Brusttumoren alle ganz breit aufsitzen. Die stielartige Basis war sehr gefäßreich, die Operation überhaupt sehr blutig; es wurden gegen 50 Gefäße mit Catgut unterbunden. Die chloroformirte Patientin collabirte aber nicht, erholte sich sehr rasch, hatte keine Nachblutung, kein Erbrechen, keine ernstlichen Schmerzen nach der Operation, und war schon am 2. Tage ganz fieberlos. Die Untersuchung der Patientin ergab weder vor noch nach der Operation etwas, was die Annahme irgend einer Metastase zuliesse. Der Heilungsproceß ging in sehr befriedigender Weise von Statten, nachdem sich die Hautränder der Wunde schon einige Tage nach der Operation per primam intentionem vereinigt hatten, konnte die Patientin am 22. d. M. geheilt aus der Anstalt entlassen werden.

Anatomischer Befund.¹⁾

Der amputirte Tumor ist von rundlicher Gestalt, hat einen Längendurchmesser von 15 cm, einen Breitendurchmesser von 14 cm und einen Dickendurchmesser von 10 cm; er ist 1040 Gramm schwer. Die Geschwulst ist etwa im Bereiche von zwei Drittel ihrer Oberfläche mit normaler verschieblicher Haut bedeckt. Nur an einer Stelle zeigt sich eine oberflächliche

¹⁾ Einlaufs-Journal Nr. 419, 1882 des Pathol. Instituts.

Exulceration von der Gröfse eines Thalerstückes; dieselbe zeigt keine Spur von Verjauchung, sondern ist mit gutem Granulationsgewebe bedeckt. Im frischen Zustande hat die Geschwulst eine hellgraue, leicht in's röthliche spielende Schnittfläche von gleichmäfsiger, lappiger, drüsenförmiger Zeichnung. Die einzelnen Lappen, kirschen- bis haselnufsgrofs, zerfallen wieder in kleinere Läppchen. Die Schnittfläche fühlt sich knollig, derb an; beim Darüberstreifen mit dem Messer läfst sich nur eine sehr geringe Menge eines wässerigen frischen Saftes abstreifen.

Das macroscopische Bild ist zu vergleichen mit dem eines Myofibroms des Uterus. Unterbrochen wird daselbe durch mehrere erbsen- bis wallnufsgrofs Herde von gelblichem Aussehen, die an einzelnen Stellen von weicherer Consistenz sind und sich schon bei oberflächlicher Betrachtung als Verkalkungen erweisen. Diese Herde zeigen auch an einzelnen Stellen Trübungen, ebenfalls schon bei macroscopischer Betrachtung als Verfettungen erkenntlich, und Cystchen, welche mit geronnenem Blute gefüllt sind.

Normale Drüsenlappen sind nicht mehr vorhanden, so dafs also, da der amputirte Tumor die ganze Mamma darstellt, die Brustdrüse vollständig in der Geschwulst aufgegangen ist.

Microscopischer Befund.

Bei der microscopischen Untersuchung findet sich Folgendes:

Bei dem Versuche, Präparate für das Microscop herzustellen, erfährt das schneidende Messer bedeutenden Widerstand von Seiten der zähen, derben Geschwulstmasse; aber es gelingt gut, feine Schnittpräparate zu erhalten.

An denselben sieht man, dafs der Tumor vorwiegend durch epitheliales Gewebe gebildet wird. Es zeigen sich scharf abgegrenzte, zum gröfsten Theile cubische Zellen, mit deutlichem, ovalem, ziemlich grossem Kerne, von unverkennbar epithelialelem Character. Das Zellenprotoplasma ist blafs,

glänzend, von frischem Aussehen. Die Zellen zeichnen sich durch grofse Gleichmäfsigkeit des Aussehens und der Form aus. Die Epithelzellenlager erstrecken sich in Kolben, propfartig angeordnet, gegen die Grenzlage hin. Diese wird gebildet durch beträchtliche streifige Massen. Auf Essigsäurezusatz hellen sich dieselben auf, und die fibrillaere Anordnung tritt deutlich hervor; bei einem Theile derselben erscheinen bei dieser Behandlung spindelförmige Zellen mit länglichem, stabchenförmigem, in der Mitte der Zelle liegendem Kerne, Zellen, die grofse Aehnlichkeit mit glatten Muskelfasern besitzen.

Wir haben also altes und junges Bindegewebe vor uns. Es geht hier progressive Wucherung von Bindegewebe Hand in Hand mit der von Epithel.

Ein Lumen ist in den drüsenförmigen Verzweigungen der Epithelzellenlager nicht nachzuweisen.

Das Microscop zeigt uns nun ferner grofse, aus ziemlich grofsen, glänzenden, rundlichen, durchsichtigen Körpern zusammengesetzte Kugeln, welche wir schon nach ihrem Aussehen als Körnchenkugeln, den Colostrumkörperchen sehr ähnlich, ansprechen dürfen, in geringer Menge; bei Behandlung mit Aether lösen sich dieselben auf.

Auch einzelne grofse, rhombische Tafeln, die sich ebenfalls bei Zusatz von Aether auflösen: Cholestearincrystalle bekommen wir zu Gesicht.

Außerdem finden sich an einzelnen Stellen spindelförmige Zellen, deren bei Zusatz von Essigsäure zur Erscheinung kommende längliche Kerne nicht in der Mitte der Zelle, sondern deren Hülle hart anliegen, wodurch sie sich uns als glatte Muskelfasern erweisen. — Die microscopische Untersuchung der erbsen- bis wallnufsgrofsen Herde ergibt, dafs dieselben aus schwieligem Bindegewebe mit Kalk bestehen und an einzelnen Stellen Fett enthalten.

Auch finden sich rothe und weisse Blutkörperchen.

D i a g n o s e.

Die erste Frage, welche sich uns bei Untersuchung einer Geschwulst der weiblichen Brustdrüse aufdrängt, ist die:

Haben wir es hier mit jener gefürchteten, bösartigen Neubildung zu thun, der nach unseren bisherigen Erfahrungen die davon betroffene Frau über kurz oder lang mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit, oft unter schrecklichen Qualen, zum Opfer fällt, — die in neuerer Zeit häufiger mitgetheilten Fälle von geheiltem Krebs dürften wohl öfter auf Verwechslung von Carcinom mit Adenom beruht haben — oder ist die Erkrankung vielleicht eine gutartige? Leider fällt die Antwort meist im schlimmen Sinne aus; ob dies auch in unserem Falle zutrifft, möge folgende Erörterung darthun.

Die Geschwulst wurde von der jetzt 44jährigen Frau schon als Mädchen von 16—20 Jahren gefühlt. In ihrem 29. Jahre heirathete sie und schenkte 6 gefunden Kindern das Leben. Der Tumor macht in seinem Wachsthum wiederholt lange Stillstand, und scheint nur die gesteigerte Lebensthätigkeit, welche die Gravidität jedesmal in der Brustdrüse hervorruft, die schubweise Vergrößerung der Geschwulst herbeigeführt zu haben. Länger als 10 Jahre war die Patientin mit derselben behaftet, ohne dass ihr dadurch erhebliche Schmerzen erwachsen wären.

Vergleichen wir nun diesen Verlauf der Krankheit mit dem, wie er bei Carcinom der Brustdrüse in der Regel vorkommt.

Das Mammacarcinom kommt selten vor dem 30. Lebensjahre vor. Nach Velpeau befanden sich unter 301 an Krebs der Brustdrüse Erkrankten 4 Personen, das ist 1,32% im Alter von 20—30 Jahren; nach Billroth unter 238 solchen Patienten 12, das ist 5,46% in diesem Alter; und Birkett zählt unter 458 an Mammacarcinom leidenden Frauen 19, das 4,14% in diese Rubrik.

Summirt man die gefundenen Zahlen dieser 3 Beobachter,

so ergibt sich, daß unter 997 an Brustdrüsenkrebs Erkrankten 35, das ist 3,61% jünger als 30 Jahre waren, während vor dem 20. Jahre überhaupt kein sicherer Fall von Carcinom der Mamma bekannt ist.

Eine an Krebs der Brustdrüse leidende Frau wird selten noch gebären.¹⁾

Die in Rede stehende Krankheit führt in den meisten Fällen innerhalb einiger Jahre zum Tode. Es sind zwar Fälle bekannt wo bei Brustdrüsenkrebs das Leben noch längere Zeit erhalten blieb, ohne daß die Betroffene in erheblichem Grade davon zu leiden gehabt hätte; aber diese Fälle sind äußerst selten, und besonders wird ein Mammacarcinom der Erkrankten in der Regel bald eine Quelle mehr oder minder großer Schmerzen werden.

Das Carcinom der Mamma wird ferner kaum so viele und so lange Pausen in seinem Wachsthum machen, wie sie in dem beschriebenen Falle beobachtet wurden.

Die Anamnese macht daher im vorliegenden Falle die Existenz eines Carcinoms unwahrscheinlich; doch wäre es wohl möglich, daß die Geschwulst lange Zeit gutartiger Natur gewesen wäre und erst später den schlimmen Character angenommen hätte.

¹⁾ Ein derartiger seltener Fall kam am 19. Oktober 1882 im Pathol. Institut zur Section: Eine Frau von 40 Jahren, die beiläufig seit Jahresfrist an einer Geschwulst der Mamma litt, kam im Sommer 1882 nach München, um sich operiren zu lassen. Die Operation wurde wegen bestehender Schwangerschaft verweigert. Im September wurde Patientin von einem lebenden Kinde entbunden, welches 8 Tage lebte (Section fand leider nicht statt). Am 10. Oktober wurde ein in ausgedehnter Verjauchung begriffenes, mannskopfgroßes Medullarcarcinom operativ entfernt. Die Patientin, die schon vor der Operation hohes Fieber zeigte, starb 8 Tage später an jauchiger Pleuritis der betreffenden Seite.

R. Frommel macht in der Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäecologie, B. V. Heft 2. 1880, auf die relative Häufigkeit der Gravidität bei Carcinom des Cervix Uteri aufmerksam.

Sehen wir daher weiter, was uns der Zustand der Patientin sowie der der Geschwulst zur Zeit der Operation für Schlüsse zur Beurtheilung des Falles ziehen läßt.

Bei einem größeren und länger bestehenden Mammacarcinom kommt es in der Regel bald zur Verlöthung der Geschwulst mit der Haut, es kommt zu regressiven Processen innerhalb des Tumors und zu verjauchenden Exulcerationen, es bilden sich Metastasen in benachbarten Gebilden.

Hier ist die Haut über dem Tumor gut verschieblich, normal, der Tumor fühlt sich überall knollig, derb an; die einzige von der Haut entblößte Stelle zeigt keine Spur von Verjauchung, sondern es ist das flache, oberflächliche Geschwür mit guten Granulationen bedeckt — der Defect ist wahrscheinlich durch den Druck der Geschwulst auf die stark gespannte Haut entstanden —; die genaueste Untersuchung der Patientin ergibt keinen Anhaltspunkt für die Annahme einer Metastase, da selbst die Achseldrüsen keine Spur von Anschwellung oder Verhärtung zeigen. Auch der Umstand, daß die Geschwulst gestielt ist, muß in's Auge gefaßt werden. Bei einem größeren carcinomatösen Tumor dürfte das nicht leicht vorkommen, da es ebenso wie vorne zur Verlöthung der Geschwulst mit der Haut hinten zu solchen mit dem Muskel kommen wird.

Die helle, frische, gleichmäßig beschaffene Schnittfläche, die zähe, derbe Beschaffenheit, die lappige, drüsenförmige Zeichnung derselben, das Fehlen eines Krebsaftes sprechen gegen Carcinom.

Während die Derbheit der Geschwulst allenfalls an ein Scirrhus denken ließe, aber am ehesten an Fibrom mahnt, weist die lappige, gleichmäßige, drüsenförmige Zeichnung, welche die Schnittfläche der Geschwulst darbietet, auf adenoiden Character derselben hin.

Sicheren Aufschluß über die Natur der hier vorliegenden Krankheit gibt uns das Microscop.

Die vorwiegende Zusammensetzung der Geschwulst aus Epithelzellen characterisirt dieselbe als eine epitheliale Neubildung. Jedoch die scharfen Abgrenzungen der einzelnen Zellen, ihre zum allergrößten Theile cubische Form, ihr blasses, glänzendes, frisches Protoplasma, ihre große Gleichmäßigkeit in Form und Ansehen, der Mangel jeder regressiven Metamorphose sprechen ebenso sehr gegen Carcinom, als anderseits ihre kolbige, propfartige Anordnung, die drüsenförmige Verzweigung der Zellenlager auf Adenom hinweisen.

Die anwesenden Körnchenkugeln lassen sich als das Product einer regressiven Metamorphose nicht auffassen wegen ihrer geringen Menge und deswegen, weil sich sonst auch an einem Theile der Zellen auf Verfettung hinweisende Momente finden würden; vielmehr werden sowohl sie als auch die sich vorfindenden spärlichen Cholestearincrystalle aus zerfallenen Colostrumkörperchen sich gebildet haben. Einzelne Geschwulstelemente haben demnach noch einen geringen Grad von physiologischer Functionsfähigkeit bewahrt.

Neben den Epithelzellenlagern finden sich nun aber auch Bindegewebsmassen in solch' reichlicher Menge in dem Tumor vor, daß sie nicht mehr als das Stroma eines Adenoms betrachtet werden können, sondern zur Characterisirung der Geschwulst mit in Betracht gezogen werden müssen, und dieselbe sich demnach als ein Fibro-Adenom qualificirt. Der übrige Befund ist als nebenfächlich oder zufällig zu betrachten.

Die wenigen glatten Muskelfasern sind als Residuen der Muskulatur der gefunden Brustdrüse anzusprechen, welche sich in den Ausführungsgängen, und zwar nur hier, im normalen Zustande derselben vorfindet.

Die Verkalkungen werden eine Folge von Compression der ernährenden Gefäße durch das neugebildete Bindegewebe, die Cystchen in denselben das Resultat einer Abschnürung von Drüsengängen sein.

Die Prognose ist eine gute. Der Eintritt eines Recidivs

musste zu der Annahme führen, daß nicht alles Neugebildete entfernt worden sei. Da dies nach dem Ergebniss der Untersuchung und der Ausführung der Operation nicht wahrscheinlich ist, bin ich der Ueberzeugung, daß der künftige Gesundheitszustand der operirten Patientin unsere Diagnose in jeder Beziehung bestätigen wird.

Zum Schlusse erfülle ich die angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. Bollinger für die Uebernahme des Präsidiums, Herrn Generalstabsarzt, Professor Ritter Dr. von Nufsbaum für die Ueberlassung des Materials und Herrn Professor Dr. Bonnet für die freundliche Unterstützung bei der microscopischen Untersuchung den geziemenden Dank auszusprechen.

L i t e r a t u r.

- 1) Billroth, Krankheit der Brustdrüsen, Lief. 41 von: Deutsche Chirurgie. Herausgegeben von Billroth und Luecke. 1880. — 2) Klob, Pathologische Anatomie der weiblichen Sexualorgane 1864. — 3) Rindfleisch, Pathologische Gewebelehre 1878. — 4) Birch-Hirschfeld, Pathologische Anatomie 1877. — 5) Foester, Specielle pathologische Anatomie 1863. — 6) Virchow, Die krankhaften Geschwülste 1863. — 7) Uhle und Wagner, Allgemeine Pathologie 1877. — 8) Perls, Allgemeine Pathologie 1877/79. — 9) Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynaecologie, Band V. Heft 2. 1880.
-

